


# Les déshydratés

## pour vos génisses

Pour l'élevage de vos génisses laitières, **Coopédome** vous propose différents plans d'alimentation à base de produits déshydratés, permettant d'adapter vos rations d'hiver et d'été aux besoins de vos animaux.

**Avant** le sevrage :



**Proposez à vos animaux un mélange équilibré et appétant :**

*\* L'apport de correcteur azoté est à moduler en fonction de la qualité du foin et de l'état des fécès.*

### Mélange 1 à volonté

- 2/3 aliment démarrage
- 1/3 maïs épi déshydraté
- + foin/paille à volonté

ou

### Mélange 2 à volonté

- 3/4 maïs épi déshydraté
- 1/4 correcteur azoté type soja 48\*
- CMV (6-24) : 25 g par kg de mélange
- + foin/paille à volonté

**Ce type de rations permettra un bon développement de vos animaux tout en contrôlant parfaitement leur croissance.**

Le démarrage des génisses est la phase la plus importante pour avoir des animaux à fort potentiel laitier. Les aliments déshydratés sont pour vous une solution qui favorise la réussite de cette phase.

**Pensez également à la gamme « Déshyfibres » pour rendre le travail encore plus simple**



**Coopédome**

11 rue de la cidrerie 35113 Domagné • Tél : 02 99 00 05 59 • Fax : 02 99 00 08 30 • E-mail : [accueil@coopedom.fr](mailto:accueil@coopedom.fr)

## Après le sevrage :

Les rations proposées ci-dessous servent de points de repère quant à la distribution des fourrages et des produits déshydratés compatibles avec les objectifs de croissance recherchés (vêlage 24-26 mois). Naturellement, ces rations seront à moduler en fonction de vos objectifs, de la qualité des fourrages distribués et de l'état de vos animaux.



### Régimes à base de luzerne déshydratée :

Âge (mois)	GMQ (g)	Régime avec paille (kg brut)			Régime avec foin (kg brut)		
		Luzerne déshydratée	Maïs épi déshydraté	Correcteur azoté	Luzerne déshydratée	Maïs épi déshydraté	Correcteur azoté
2 à 3,5	960	(75 g de 6-24)	2,2	0,6	(75 g de 6-24)	2,2	0,6
3,5 à 5	960	0,75	2,2	0,5	0,5	2,2	0,25
5 à 7	830	3	1		1	1,3	
7 à 9	700	3	1		1	0,5	
9 à 11,5	700	3,3	1,1		1	0,5	
11,5 à 14,5	700	3,75	1,25		1	0,5	
14,5 à 17,5	700	3,8	1,8		1	0,5	
17,5 à 20,5	800	4	2,5		2	1	
20,5	800	4	2,8		4	1,4	

### Régimes à base de RGA déshydraté :

Âge (mois)	GMQ (g)	Régime avec paille (kg brut)			Régime avec foin (kg brut)		
		RGA déshydraté	Maïs épi déshydraté	Correcteur azoté	RGA déshydraté	Maïs épi déshydraté	Correcteur azoté
2 à 3,5	960	(75 g de 6-24)	2,2	0,6	(75 g de 6-24)	2,2	0,6
3,5 à 5	960	1,5	1,5	0,4	1	1,25	0,25
5 à 7	830	3,3	0,5		1,5	0,25	
7 à 9	700	3,4			1		
9 à 11,5	700	3,8			1		
11,5 à 14,5	700	4,2			1		
14,5 à 17,5	700	4,2	0,5		1		
17,5 à 20,5	800	4,2	1,5		1,8		
20,5 au vêlage	800	4,2	1,8		2,5		

Les rations à base de foin présentées ci-dessus ont été calculées avec un foin de très bonne qualité (RGA + Trèfle Blanc).

Si le foin est de qualité moyenne (ex : RGI épié), il convient de distribuer des quantités de déshydratés intermédiaires entre les rations à base de foin et les rations à base de paille.